

VNR(weekly)+ハーセプチン

| レジメン | 薬品名 | 標準投与量 | 計算式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| | | VNR | 25mg/m ² | 標準量×BSA | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ハーセプチン | 2mg/m ² | 標準量×BSA | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (ただし、ハーセプチンは初回だけ4mg/kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 (3) 週を1クールとして (数) 回繰り返す

連続PAC

| レジメン | 薬品名 | 標準投与量 | 計算式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|------|-----|--------|---------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|--|
| | | パクリタセル | 80mg/m ² | 標準量×BSA | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | ↓ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2 連続投与